

Tegevusaruanne: Meede 2 Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid

Periood: 01.03. – 31.08.2011.a.

Koht: Pärnumaa, Häädemeeste vald, Soometsa küla

Vaatleja: Aare Jõumees, Töövõtuleping nr PR-7-2.1-2

Kokkuvõte varroatoosi vaatlusest ja lestaloendusest

1. Mesila aadress: Pärnumaa, Häädemeeste vald, Soometsa küla
2. Mesiniku kontaktandmed: Aare Jõumees, aarejoumees@gmail.com, 5160157
3. Mesilasgrupi suurus: 22 peret
4. Tootmisuund: tootmismesila, emade kasvatus
5. Tarutüüp: korpustarud
6. Põhilised korjetaimed: võilill, ristik, raps, vaarikas, kanarbik, pärn
7. Mesilas diagnoositud haigused: varroatoos vähesel määral
8. Talvitumisel mesilasperede suremuse protsent: keskmiselt 1%
9. Varroatoosi raviskeem ja ravimid: Varroatoosi ravitud kevadise lesehaudme lõikamisega. Peale meevõtmist kasutatud Fumisani ribasid, hilissügisel kasutatakse oblikhape tilgutamist.
10. Kevadise langetiseuuringute tulemused: varroalesta ei leitud

Varroalestast on saanud meie mesilates juba ammu tegelane, kellega tuleb arvestada ja kelle käitumist tuleb jälgida aasta läbi. Päris lahti temast ei ole õnnestunud saada. Küll aga saab tema arengut ja levikut takistada erinevate võtetega. Püüan järgnevalt kirjeldada võtteid, mida mina kasutan varroatoosiga võitlemiseks.

Maikuu poole peal panin peresse pooleldi äralõigatud kärjed. Mesilased ehtasid sinna lesehaudme. Kuna lese areng on pikem kui töomesilase oma ja ka temperatuur selles kohas madalam, siis lähevad emaslestad meelsamini sinna munema vahetult enne haudme kaanetamist. Kui haue kaanetatud, siis lõikasin lesehaudme koos sinna kogunenud emaslestadega välja. Mida rohkem emaslesti suve esimesel poolel välja saab, seda tervemad pered sügisel on.

Lesehaudet lõikan 2 korda. Seejärel panen lõigatud pooliku kärje meekorpusesse. Kindlasti tuleb meeles pidada, et lesehaudet ei tohi lõigata enne haudme kaanetamist. Ka ei tohi nõ maha magada seda hetke, mil lesed hakkavad juba kooruma, sest siis nad kooruvad juba koos lestadega. Töömahukas see meetod on, aga annab päris hea tulemuse. Suve jooksul vaatasin

pistelisel mõnda lesekannu, et lesta poleks. Viimase aasta jooksul pole õnneks ühtegi lesta näinud.

Augusti lõpus kui peresid koondan ja mett ära võtan, panen peredele *Fumisani* ribad sisse. Need jäävad peredesse kevadeni. Hilissügisel, kui pered talveks sisse söödetud, teen veel oblikhape tilgutamist. Nii olen suutnud oma mesilaspered hoida varroalestast vähe häiritud.

Lisan tabeli, kus võrkpõhjate meetodil on vaadeldud nelja pere seisukorda 2011.a.